


Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX



ABONNEMENT ANNUEL : 95 Frs Régisseur Recettes O.D.A. CCP OJON 3405-12 K

☎ (80)22.19.38

ÉDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 10 - 3 mai 1984

COLZA

SCLEROTINIA : PARCELLES A RISQUES D'ATTAQUES GRAVES ; C'EST LA PÉRIODE POUR TRAITER

STRATEGIE GENERALE DE LUTTE : Voir bulletin n° 8 du 18 avril 1984

SITUATION ACTUELLE - PRECONISATIONS :

* Dans les secteurs les plus en avance, ayant atteint le stade G1 en début de semaine et pas encore traités, réaliser l'intervention fongicide dès que possible en fonction des conditions météorologiques.

* Dans les secteurs plus en retard (étant au stade début floraison en début de semaine), prévoir le traitement dans le début de la semaine prochaine : Tenir compte de l'évolution de la situation météorologique et des possibilités de pénétrer dans les parcelles après une pluie.

* Utiliser de préférence *Sportak PF* à 1,5 l/ha plus polyvalent.

CYLINDROSPORIOSE : TOUJOURS EN STAGNATION - TOUJOURS A SURVEILLER

STRATEGIE GENERALE DE LUTTE : Bulletins n° 6 du 11/04 et 9 du 26/04.

SITUATION ACTUELLE - PRECONISATIONS :

Dans les parcelles fortement atteintes, ayant ou non reçu une application fongicide dans la première quinzaine d'avril, l'évolution de la maladie sur feuilles de la tige a été très limitée depuis le 26 avril (date du dernier bulletin).

Néanmoins après les pluies irrégulières de ces derniers jours, il faut toujours **SURVEILLER L'ÉVOLUTION DE CETTE MALADIE SUR JEUNES FEUILLES DE LA TIGE.**

Compléter les observations par l'utilisation de la technique des sacs plastiques.
Conditions d'intervention : (voir bulletin n° 9 du 26/04).

CHARANCONS DES SILIQUES : TRAITEMENTS POSSIBLES

STRATEGIE GENERALE DE LUTTE : Bulletin n° 9 du 26/04.

SITUATION ACTUELLE - PRECONISATIONS :

- Confirmation des captures depuis le 23 - 24/04, parfois importantes, mais irrégulières selon les postes.

P.A.K.

- De nombreuses parcelles ont atteint la floraison et à partir de ce stade le piégeage à l'aide des cuvettes jaunes est moins important.
- SURVEILLER les parcelles en réalisant des comptages : seuil d'intervention = 1 charançon par plante.
- Dans les parcelles le justifiant, il est possible d'associer fongicide et insecticide.
- Il est également possible, en cas d'application insecticide seule, de ne traiter que le tour de la parcelle.

CEREALES

BLE TENDRE : ATTENTION AUX CONTAMINATIONS DE SEPTORIOSES

Les stades végétatifs les plus fréquents sont 6 - 7 (1-2 noeuds), cependant la dominante est plutôt 5 - 6 en Franche-Comté et 6 - 7 - 8 dans les plaines de Côte-d'Or, Saône-et-Loire et Yonne (Puisaye plus tardive).

Cela revient à dire que lorsqu'elle n'a pas été appliquée mais qu'elle se justifie (maladies présentes ou potentiel élevé), la protection devra intervenir dans les tous prochains jours.

Cette couverture fongicide devra tenir compte, outre les maladies du pied, de la présence éventuelle (et c'est souvent le cas) de Septorioses pour ce qui concerne le choix des spécialités. Cette prise en considération se justifie d'autant plus que des contaminations secondaires se sont produites lors des précipitations des 2 et 3 mai.

ORGE D'HIVER : TENIR COMPTE DE LA PROTECTION DÉJÀ EN PLACE

Le stade végétatif varie de 7 (2ème noeud) à 10.1 (tout début épiaison).

Le passage de la Rhynchosporiose sur F3 se confirme sans pour autant prendre une extension importante.

De même l'Helminthosporiose est notée assez souvent sur F3 et parfois F2 à un niveau assez faible.

En principe une protection a déjà dû être appliquée et la durée de celle-ci est de l'ordre de 15 à 20 jours. Lorsque cela n'a pas été fait il est urgent d'intervenir.

De nouvelles contaminations ont pu se produire lors des pluies orageuses des 2 et 3 mai.


NE PAS ENVISAGER UN RENOUVELLEMENT AVANT LE 10- 11 MAI POUR LES PARCELLES AYANT REÇU UN FONGICIDE DEPUIS LE 16 AVRIL.

Pour celles (peu nombreuses) où une intervention est antérieure, tenir compte de l'évolution des maladies et de la végétation (sur orge on protège les feuilles) avant toute décision de traitement.

NOTA : Attention certaines brûlures dues aux herbicides peuvent ressembler à des taches brunes (Helminthosporiose), éviter les confusions car le centre de la brûlure est souvent décoloré et non brun.



J 2 noeuds (7).



K Apparition de la dernière feuille (8).